

p-ISSN 2550-2254 | e-ISSN 2614-6541 | SINTA accredited

Jurnal Agrotek Ummat



Scope: general agriculture, food technology,
agriculture engineering & biosystem,
microbiology

CP: +62 895-3193-2874 (wa only)

ISSN 2502-2239 (Print)
ISSN 2502-2247 (Online)

JURNAL AGROTEK UMMAT



Indonesian Journal Agrotek UMMAT

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1, Yogyakarta 81256 telp. (0271) 441786

Email: Pn.Nur.Masrini, Widyad: journal.ummata@akademik.ghp.ac.id

e-mail: journal.ummata@ghp.ac.id / journal.ummata@ghp.ac.id

JURNAL AGROTEK UMMAT

p-ISSN 2356-2234 | e-ISSN 2614-6541 | SINTA accredited

JL. KH Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah

USER

Username
Password
☐ Remember me

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#)
[ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

Home > Archives > **Vol 6, No 2 (2019)**

Vol 6, No 2 (2019)

August

Tools



Social Media



Table of Contents

Articles

- [STUDI KOLONISASI FUNGI MIKORIZA ARBUSKUAR PADA GAHARU \(Gyrisops versteegii\) DENGAN SUMBER INOKULAN RIZOSFER PERKEBUNAN GAHARU](#) [PDF](#)
45-50
I Gde Adi Suryawan Wangiyana, Hidayat Wicaksono, Wahyu Yuniati Nizar
Views of Abstract: 284 | PDF: 99
- [EVALUASI SISTEM IRIGASI TERSIER PADA DAERAH IRIGASI MENINTING DI DESA JATISELA KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT](#) [PDF](#)
51-56
Budy Wiryono, Suwati Suwati, Marianah Marianah
Views of Abstract: 335 | PDF: 108
- [ANALISIS TITIK IMPAS UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI USAHATANI MELON DI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH](#) [PDF](#)
57-62
Karjono Karjono
Views of Abstract: 204 | PDF: 61
- [Aktivitas Antibakteri dari Mikroalga Laut Porphyridium cruentum terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium acne](#) [PDF](#)
63-70
Vina Juliana Anggraeni, Fajar Arip Nugraha, Aris Suhardiman
Views of Abstract: 1665 | PDF: 373
- [ANALISIS KANDUNGAN NUTRISI BUAH RENGGA \(Amomum dealbatum Roxb.\)](#) [PDF](#)
71-76
Handa Mulasari, Agus Dwi Ananto, Muhsinul Ihsan
Views of Abstract: 993 | PDF: 288
- [IDENTIFIKASI SENYAWA KIMIA DAUN BAMBU SEGAR SEBAGAI BAHAN PENETRAN LIMBAH CAIR](#) [PDF](#)
77-82
Erni Romansyah, Earlyna Sinthia Dewi, Suhairin Suhairin, Muanah Muanah, Rosyid Ridho
Views of Abstract: 1288 | PDF: 271
- [TEH BUBUK HERBAL DAUN ASHITABA DAN KULIT BUAH NAGA](#) [PDF](#)
83-90
Syirril Ihromi, Asmawati Asmawati, Earlyna Sinthia Dewi, Muliatiningsih Muliatiningsih
Views of Abstract: 749 | PDF: 218
- [ISOLASI BAKTERI PENGIKAT NITROGEN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA JENSEN](#) [PDF](#)
91-94
Feizia Huslina, Diannita Harahap
Views of Abstract: 2160 | PDF: 475
- [PENGARUH EKSTRAK DAUN MINDI \(Melia azadirach\) TERHADAP PENEKANAN PELETAKAN DAN PENETASAN TELUR ULAT HATI KUBIS \(Crocidolomia pavonana F.\)](#) [PDF](#)
95-99
Abdul Manan, Endang Mugiasuti
Views of Abstract: 491 | PDF: 112
- [MODIFIKASI PATI SECARA ASETILASI DAN APLIKASINYA PADA PEMBENTUKAN FILM](#) [PDF](#)
100-200
Nurhayati Nurhayati
Views of Abstract: 1169 | PDF: 479



PRINT ISSN



ONLINE OSSN



Quick Menu

- [Focus and Scope](#)
- [Publication Frequency](#)
- [Author Guidelines](#)
- [Publication Ethics](#)
- [Open Access Policy](#)
- [Copyright Notice](#)
- [Peer Review Process](#)
- [Plagiarism Check](#)
- [Publication Charges](#)
- [Online Submission](#)
- [How to Submit](#)
- [Licencing](#)
- [Archiving](#)
- [Indexing & Abstracting](#)
- [Editorial Team](#)
- [Reviewers](#)
- [Journal History](#)
- [Contact Us](#)

TEMPLATE



Indexing By



Alamat Kantor



VISITORS

Agrotek Visitors

ID 55,987	ES 4
US 1,863	BD 4
JP 153	DZ 3
MY 118	BE 2
IN 83	PS 2
SG 83	IR 2
PH 61	AT 2
RU 42	MW 2
CA 41	CH 2
CN 30	CU 2
TR 28	MA 2
NL 27	SA 2
TW 24	HU 2
FR 24	PE 2
DE 21	CO 2
GB 21	SZ 1
AU 19	RW 1
TH 18	ET 1
KR 14	AE 1
IE 11	CM 1
HK 11	PA 1
BR 10	KE 1
PL 9	IQ 1
VN 8	CI 1
TL 8	RS 1
NG 8	BN 1
ZA 7	AM 1
MX 7	KW 1
EG 6	IL 1
PK 6	TN 1
IT 6	OM 1
LK 6	CL 1
BG 6	AR 1
GR 5	LT 1
UA 5	SE 1
KH 4	

FLAG counter



Agrotek Visitors

STATCOUNTER

JURNAL AGROTEK UMMAT

p-ISSN 2356-2234 | e-ISSN 2614-6541 | SINTA accredited

JL. KH Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah

USER

Username
Password
☐ Remember me

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#)
[ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

Editorial Team

Tools



Social Media



Indexing By



Alamat Kantor



PRINT ISSN



ONLINE OSSN




Quick Menu

- [Focus and Scope](#)
- [Publication Frequency](#)
- [Author Guidelines](#)
- [Publication Ethics](#)
- [Open Access Policy](#)
- [Copyright Notice](#)
- [Peer Review Process](#)
- [Plagiarism Check](#)
- [Publication Charges](#)
- [Online Submission](#)
- [How to Submit](#)
- [Licencing](#)
- [Archiving](#)
- [Indexing & Abstracting](#)
- [Editorial Team](#)
- [Reviewers](#)
- [Journal History](#)
- [Contact Us](#)

TEMPLATE




VISITORS



[Agrotek Visitors](#)

[STATCOUNTER](#)



JURNAL AGROTEK UMMAT

📍 [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM](#)

★ P-ISSN : 23562234 <> E-ISSN : 26146541



0
Impact Factor



214
Google Citations



Sinta 5
Current
Accreditation

🔍 [Google Scholar](#) 📖 [Garuda](#) 🌐 [Website](#) 🌐 [Editor URL](#)

History Accreditation

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Garuda Google Scholar

Search...

[Pendugaan laju respirasi pisang barangan menggunakan model arrhenius](#)

[Universitas Muhammadiyah Mataram](#) 📖 [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 20-29](#)

📅 2023 🗉 DOI: [10.31764/jau.v10i1.12168](#) 🏆 [Accred : Sinta 5](#)

[Analisis distribusi kebutuhan pangan pokok hasil pertanian di Kota Mataram](#)

[Universitas Muhammadiyah Mataram](#) 📖 [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 40-54](#)

📅 2023 🗉 DOI: [10.31764/jau.v10i1.12228](#) 🏆 [Accred : Sinta 5](#)

[Karakteristik briket ampas tebu \(bagasse\) dari bahan perekat tepung beras ketan](#)

[Universitas Muhammadiyah Mataram](#) 📖 [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 1-8](#)

📅 2023 🗉 DOI: [10.31764/jau.v10i1.12266](#) 🏆 [Accred : Sinta 5](#)

[Kualitas kimia, organoleptik, dan aktivitas antioksidan kopi robusta \(Coffea canephora\) dengan penambahan bubuk daun kelor](#)

[Universitas Muhammadiyah Mataram](#) 📖 [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 9-19](#)

📅 2023 🗉 DOI: [10.31764/jau.v10i1.12417](#) 🏆 [Accred : Sinta 5](#)

[Identifikasi risiko ergonomi dengan metode Nordic Body Map \(NBM\) pada pekerja pembuatan tahu di kelurahan Abian Tubuh Kota Mataram](#)

[Universitas Muhammadiyah Mataram](#) 📖 [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 30-39](#)

[Pengaruh pemberian pupuk organik cair limbah kulit udang \(Panaeus monodon L.\) terhadap produksi tanaman kacang panjang \(Vigna sinensis L.\)](#)
Universitas Muhammadiyah Mataram  [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 76-84](#)

[Karakteristik pengeringan pisang kepok berdasarkan ketebalan irisan dan proses bolak balik pada pembuatan pisang sale](#)
Universitas Muhammadiyah Mataram  [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 66-75](#)

[Pengaruh formulasi tepung terigu dan tepung beras terhadap karakteristik organoleptik pepaya crispy \(Carica papaya L.\)](#)
Universitas Muhammadiyah Mataram  [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 92-101](#)

[Respon pertumbuhan dan hasil tanaman terung \(solanum melongena L.\) terhadap pemberian pupuk organik cair ekstrak buah mengkudu \(morinda citrifolia L.\) di lahan rawa lebak](#)
Universitas Muhammadiyah Mataram  [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 55-65](#)

[Kontribusi usahatani sayuran katuk \(Sauropus androgynus\(l\).merr \) terhadap pendapatan petani di Desa Lubuk Rengas Kabupaten Banyuasin](#)
Universitas Muhammadiyah Mataram  [Jurnal Agrotek Ummat Vol 10, No 1 \(2023\): January 85-91](#)

PENGARUH EKSTRAK DAUN MINDI (*Melia azadirach*) TERHADAP PENEGKANAN PELETAKAN DAN PENETASAN TELUR ULAT HATI KUBIS (*Crociodolomia pavonana* F.)

Abdul Manan^{1*} dan Endang Mugiastuti²

¹Agroteknologi, Universitas Jenderal Soedirman, abdulmanan.unsoed@gmail.com

²Agroteknologi, Universitas Jenderal Soedirman

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 01-07-2019

Disetujui: 11-08-2019

Kata Kunci:

Mindi

C. pavonana

Peletakan telur

Penetasan telur

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi daun mindi yang efektif untuk menekan peletakan dan penetasan telur *C. pavonana*. Percobaan dilaksanakan di Laboratorium Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Unsoed Purwokerto. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan yang dicoba adalah konsentrasi ekstrak daun mindi 0%, 2,5%, 5,0%, 7,5%, dan 10%. Parameter yang diamati adalah jumlah kelompok telur yang diletakkan dan jumlah kelompok telur yang menetas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ekstrak daun mindi 7-10% mampu menekan 100,00% peletakan telur, dan ekstrak daun mindi 10% mampu menekan 90,92 % penetasan telur.

Abstract: This research aims to determine the effective concentration of melia leaf extract in suppressing the eggs laying and egg hatching of *C. pavonana*. This research was conducted at the Laboratory of Plant Protection Faculty of Agriculture Unsoed at Purwokerto. The design used was randomized block design. The treatments tested were concentration of melia leaf extract 0, 2.5%, 5.0%, 7.5%, and 10.0%. The variables measured were the number of clusters of eggs laid and number of eggs that hatched. The results showed that melia leaf extract concentration of 7.5-10.0 % was effective in suppressing the oviposition of *C. pavonana* amounted to 96,00 % and concentration of 10% was effective in suppressing egg hatching of *C. pavonana* of 90,9 %.

A. LATAR BELAKANG

Kubis (*Brassica oleracea* var. capitata) merupakan tanaman sayuran yang banyak disukai masyarakat Indonesia, karena rasanya yang renyah dan segar, serta banyak mengandung vitamin, mineral, serta serat. Disamping banyak digunakan sebagai bahan dalam masakan sehari-hari, saat ini senyawa aktif yang dikandung kubis banyak diteliti sebagai obat herbal. [1], [2], [3], dan [4] melaporkan senyawa glukosinolat dan senyawa hidrolisisnya seperti indol dan isotiosianat terbukti mengurangi resiko kanker dan beberapa penyakit lainnya.

Produksi kubis nasional masih tergolong rendah, pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.513.326 ton, dan cenderung naik dari tahun ke tahun [5]. Permintaan sayuran ini dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan tingkat kesejahteraan serta kesadaran gizi masyarakat.

Peningkatan produksi kubis nasional masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utamanya adalah serangan ulat krop kubis (*Crociodolomia pavonana*). Hama ini merusak tanaman kubis dari tanaman muda sampai hampir panen. Kehilangan hasil akibat serangan hama ini dapat mencapai 100 % terutama pada musim kemarau [6]; [7]; [8]; [9].

Pengendalian *C. pavonana* oleh petani lebih ditekankan kepada penggunaan pestisida kimia sintetis. Namun demikian, telah diketahui penggunaan cara tersebut tidak ekonomis dan banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kerugian yang diakibatkan oleh cara tersebut mendorong perlunya dicari cara pengendalian efektif tetapi ramah lingkungan yaitu pemanfaatan pestisida nabati [10].

Tanaman mindi (*Melia azederach*) merupakan salah satu anggota famili Meliaceae yang banyak

digunakan sebagai bahan pestisida nabati [11]; [12]; [13]; [10] Biji yang sudah tua merupakan bagian tanaman yang biasa digunakan sebagai pestisida nabati karena kandungan senyawa aktifnya paling tinggi [14]. Namun demikian, penggunaan biji sebagai bahan pestisida nabati terkendala musim dan kelimpahannya yang sulit dicapai. Oleh karena itu, pemilihan daun mindi sebagai bahan pestisida nabati merupakan alternatif yang potensial. Disisi lain, upaya pengendalian hama di lapangan masih belum memuaskan, karena hama *C. pavonana* masuk kedalam krop kubis sehingga sulit dikendalikan. Oleh karena itu upaya pengendalian terhadap hama lebih ditekankan kepada upaya menggagalkan imago hama untuk meletakkan telur dan menekan penetasan telurnya sebelum larva masuk ke dalam krop. Namun demikian informasi mengenai konsentrasi yang efektif untuk menekan peletakan dan penetasan telur hama ini relatif kurang tersedia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: konsentrasi ekstrak daun mindi yang efektif menekan peletakan dan penetasan telur *C. Pavonana*. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pengendalian hama *C. pavonana* secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan serta melengkapi komponen Pengendalian hama terpadu yang sudah ada.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Unsoed Purwokerto selama 4 (empat) bulan, dari bulan Januari sampai bulan April 2018. *C. pavonana* yang digunakan diperoleh dari pertanaman kubis di desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ($\pm$ 1100 m dpl) yang kemudian dikembangkan di Laboratorium. Daun mindi merupakan koleksi Laboratorium Perlindungan Fakultas Pertanian Unsoed. Pengujian peletakan telur menggunakan sangkar kain kasa berukuran 100x40x40 cm; sedangkan pengujian penetasan telur menggunakan cawan petri diameter 12 cm.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua set percobaan. Percobaan pertama adalah uji kemampuan ekstrak daun mindi terhadap peletakan telur *C. pavonana*. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan yang dicoba adalah: ekstrak daun mindi 0% (0 g daun mindi/100 ml air), 2,5% (2,5 g daun mindi/100 ml air), 5,0% (5,0 g daun mindi/100 ml air), 7,5% (7,5 g daun mindi/100 ml air), dan 10% (10g daun mindi/100 ml air).

Daun kubis disemprot ekstrak daun mindi sesuai perlakuan dan dikeringanginkan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sangkar kain kasa yang berisi 200 pasang dewasa *C. pavonana* yang baru keluar dari pupa. Daun kubis diinkubasikan selama 24 jam, kemudian dihitung jumlah kelompok telur yang menempel pada daun kubis. Penelitian kedua adalah uji kemempnanan

ekstrak daun mindi terhadap penetasan telur *C. pavonana*. Rancangan yang digunakan adalah rancangan Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan yang dicoba adalah konsentrasi ekstrak daun mindi 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10%. Lima kelompok telur *C. pavonana* disemprot ekstrak daun mindi sesuai perlakuan. Kelompok telur tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri. Jumlah kelompok telur yang menetas selama 3, 4, 5, dan 6 hari setelah perlakuan kemudian diamati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji kemempnanan ekstrak daun mindi terhadap peletakan telur *C. pavonana*

Jumlah kelompok telur yang diletakkan imago *C. pavonana* pada perlakuan konsentrasi daun mindi disajikan pada tabel 1. Kelompok telur terbanyak diletakkan pada perlakuan kontrol yaitu 15,0 kelompok telur, sedangkan jumlah kelompok telur pada perlakuan ekstrak daun mindi pada berbagai konsentrasi lebih sedikit. Jumlah kelompok telur pada perlakuan ekstrak daun mindi 2,5% mencapai 4,2 kelompok telur dan semakin turun seiring dengan meningkatnya konsentrasi, bahkan pada perlakuan ekstrak daun mindi 7,5 dan 10% tidak ada kelompok telur yang diletakkan sama sekali (Tabel 1).

Tabel 1.
Jumlah kelompok telur *C. pavonana* yang diletakkan pada perlakuan konsentarsi ekstrak daun mindi

Perlakuan	Jumlah kelompok telur yang diletakkan	Penekanan peletakan telur (%)
Kontrol	15,0 d	-
Ekstrak daun mindi 2,5 %	4,2 b	72
Ekstrak daun mindi 5,0 %	0,6 b	96
Ekstrak daun mindi 7,5 %	0,0 a	100
Ekstrak daun mindi 10,0 %	0,0 a	100

Keterangan: Angka dalam kolom yang sama yang diikuti huruf kecil sama tidak berbeda nyata menurut DMRT 5%.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa semua perlakuan ekstrak daun mindi berpengaruh nyata terhadap jumlah kelompok telur yang diletakkan dibandingkan dengan kontrol. Hal ini membuktikan ekstrak daun mindi mengandung senyawa kimia yang mempunyai efek antipeletakan telur terhadap imago *C. pavonana*. [15] melaporkan bahwa, mindi mengandung senyawa yang bersifat bioaktif yaitu: alkaloid, tanin, saponin, fenolik, triter penoid dan flavonoid. Senyawa ini berfungsi sebagai zat antifeedant dan repellent bagi hama sasaran dan sebagai antibakteri bagi kesehatan manusia [16]. Senyawa bioaktif tersebut

diduga berfungsi sebagai penolak sehingga serangga dewasa enggan meletakkan telurnya.

Efektivitas anti peletakan telur sudah terlihat pada perlakuan 2,5 ekstrak daun mindi dengan penekanan peletakan telur sampai 72,0%. Efektivitas anti peletakan telur tersebut meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi ekstrak daun mindi yang diperlakukan. Anti peletakan telur tertinggi dicapai pada perlakuan 7,5 dan 10 % ekstrak daun mindi dengan anti peletakan telur mencapai 100,00 %. Kemampuan ekstrak daun mindi dalam menekan peletakan telur serangga juga dilaporkan oleh Thakur dan Gupta (2013), perlakuan ekstrak daun mindi 3% mampu menekan peletakan telur lalat buah *Bactrocera* spp. pada buah tomat dan cucurbitace sebesar 83,2%. Selanjutnya [17] melaporkan, walaupun aplikasi ekstrak mindi tidak mempengaruhi jumlah telur kutu kebul *Bemisia argentifolii* yang diletakkan namun mampu menekan jumlah telur yang menetas. Aplikasi ekstrak mindi juga dilaporkan tidak berpengaruh terhadap kehidupan parasitoid *Eretmocerus rui*, sehingga dapat dipadukan dengan pengendalian secara hayati.

Peletakan telur oleh serangga betina dewasa merupakan proses interaksi antara serangga dan tanaman inang. Ada tidaknya senyawa kimia tertentu yang dapat menarik serangga dewasa untuk meletakkan telur merupakan faktor yang paling menentukan [18]; [19]. [20] menambahkan, peletakan telur oleh serangga betina dewasa berawal dari stimulus warna hijau dari daun tanaman inang, kemudian dilanjutkan dengan rangsangan senyawa volatil maupun yang non volatil yang terkandung dalam tanaman inang. Tanaman Famili Brassicaceae mengandung senyawa golongan glukosinolat [21]. Kelompok senyawa glukosinolat tersebut oleh [22] dianalisis sebagai glucobrassicin (komponen utama), kemudian beberapa komponen lainnya yaitu: glukioiberin, glukorapanin, sinigrin, dan neoglucobrassicin. Selanjutnya Halkier dan [23], melaporkan senyawa glukosinolat merupakan senyawa dengan kandungan sulfur tinggi, adanya enzim mirosinase mengurai senyawa glukosinolat menjadi isothiosianat, tiosianat dan nitril yang mempunyai efek bioaktif yang berbeda. Selanjutnya isotiosianat isothiosianat dapat dikenali oleh alat indera serangga hama kubis sehingga tertarik untuk meletakkan telur. Adanya perlakuan ekstrak daun mindi mampu mengacaukan komunikasi antara tanaman dan serangga sehingga stimulus yang dihasilkan daun kubis tidak dapat menarik imago betina *C. pavonana* untuk meletakkan telurnya.

2. Uji kemempnan ekstrak daun mindi terhadap penetasan telur *C. pavonana*

Jumlah kelompok telur yang diletakkan imago *C. pavonana* pada perlakuan konsentrasi daun mindi disajikan pada tabel 2. Persentase telur *C. pavonana* yang menetas bervariasi. Persentase telur menetas tertinggi terdapat pada perlakuan kontrol yaitu 88%; sedangkan persentase telur menetas pada perlakuan ekstrak daun mindi pada berbagai konsentrasi lebih sedikit. Pada perlakuan ekstrak daun mindi persentase telur menetas semakin sedikit dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak yang diperlakukan. Pada perlakuan ekstrak daun mindi 2,5% mencapai 68,0 % telur menetas dan semakin turun sampai pada perlakuan 10,0 % persentase telur menetas mencapai 8,0 % (Tabel 2). Hasil pengamatan menunjukkan kelompok telur yang diperlakukan dengan ekstrak daun mindi mengalami perubahan warna menjadi kekuningan, kemudian kecokelatan, dan pada akhirnya telur yang sudah mati tersebut ditumbuhi jamur saprofitik. Hal ini membuktikan bahwa ekstrak daun mindi mampu mempengaruhi embrio yang ada dalam telur sehingga tidak mampu berkembang lebih lanjut. Namun demikian, mekanisme daun mindi untuk dapat mematikan telur serangga masih belum diinformasikan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

Tabel 2.
Persentase kelompok telur *C. pavonana* yang menetas pada perlakuan konsentrasi ekstrak daun mindi

Perlakuan	Kelompok telur yang menetas (%)	Penekanan penetasan telur (%)
Kontrol	88,0 d	-
Ekstrak daun mindi 2,5 %	68,0 cd	22,7
Ekstrak daun mindi 5,0 %	64,0 c	27,3
Ekstrak daun mindi 7,5 %	40,0 b	54,5
Ekstrak daun mindi 10,0 %	8,0 a	90,9

Keterangan: Angka dalam kolom yang sama yang diikuti huruf kecil sama tidak berbeda nyata menurut DMRT 5%.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa semua perlakuan ekstrak daun mindi berpengaruh nyata terhadap persentase telur menetas dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Hal ini membuktikan ekstrak daun mindi mempunyai efek anti penetasan telur *C. pavonana*. Efektivitas anti penetasan telur sudah terlihat pada perlakuan 5,0 ekstrak daun mindi dengan penekanan peletakan telur sampai 27,3 %. Efektivitas anti penetasan telur tersebut meningkat tajam dengan semakin meningkatnya konsentrasi ekstrak daun mindi yang diperlakukan. Pada perlakuan 7,5 % ekstrak daun mindi antipenetasan mencapai 54,55%.

Sedangkan antipenetasan telur tertinggi dicapai pada perlakuan 10 % ekstrak daun mindi dengan anti penetasan telur mencapai 90,9%. Senyawa bioaktif yang dikandung ekstrak daun mindi diduga mampu mempengaruhi ebrío dalam telur sehingga tidak berkembang lebih lanjut.

Azadirachtin merupakan senyawa bioaktif utama yang terkandung dalam tanaman Famili Meliaceae termasuk didalamnya tanaman mindi. Senyawa ini beserta komponen lainnya mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serangga melalui beberapa mekanisme [24]. Kemampuan azadirachtin sebagai ovisida dilaporkan beberapa peneliti dengan hasil yang bervariasi. [25], melaporkan bahwa perlakuan azadirachtin dengan metode dipping mampu menekan penetasan telur *Earias vittella* secara nyata. Selanjutnya [26] melaporkan, azadirachtin 2 % mampu menekan penetasan telur *Earias vittella* sampai 95,82%. Hasil penelitian yang beragam ini diduga disebabkan perbedaan morfologi dan fisiologi dari telur serangga uji.

D. SIMPULAN

1. Ekstrak daun mindi konsentrasi 7-10% mampu menekan 100% peletakan telur imago betina *C. pavonana*
2. Ekstrak daun mindi konsentrasi 10% mampu menekan 90,9% penetasan telur *C. pavonana*

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Higdon, J.V, Delage, B., Williams, D.E. and Dashwood, R.H. 2007. Cruciferous vegetables and human cancer risk: epidemiologic evidence and mechanistic basis. *Pharmacol Res.* 55(3):224-36.
- [2] Keck A.S, and Finley, J.W. 2004. Cruciferous vegetables: cancer protective mechanisms of glucosinolate hydrolysis products and selenium. *Integr Cancer Ther.* 3(1):5-12.
- [3] Rokayya, S., Li, C.J., Zhao, Y., Li, Y., and Sun, C.H. 2013. Cababge (*Brassica oleracea* var. Capitata) Phytochemicals with antioxidant and anti-inflammatory potential. *Asian Pasific Jurnal of Cancer Prevention* 14(11):6657-6662, DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2013.14.11.6657.
- [4] Tjitaresmi, A., Kusuma, S.A.F., dan D. Rusmiati, 2017. Cabbage leaf extract (*Brassica oleracea* var. capitata) as a herbal medicine for leukorrheal. *Asian Journal of Pharmaceutichal and Clinical Research Special Isue* (May):38-40. DOI:http://dx.doi.org/110.22159/ajpcr.2017.v10s2.19483.
- [5] BPS, 2017. Produksi Tanaman sayuran , https://www.bps.go.id/site/resultTab, diakses 1 September 2017.
- [6] Paat, F.J., Palealu, J. dan Manueke, J. 2012. Produksi kubis dan presentasi serangan *Crocidolomia pavonana* pada beberapa pola tanam kubis. *Eugenia* 18(1):72-80.
- [7] Dhandapani, N., Shelkar, U.R., and Murugan, M. 2003. Bio-Intensive Pest Management (BIPM) in major vegetable crops: an Indian prespective. *Food, Agriculture & Environment*, 1(2):333-339.
- [8] Sastrosiswojo, S., Uhan, T.S., Sutarya, R. 2005. Penerapan Teknologi PHT pada Tanaman kubis. Monografi No. 21. ISBN: 979- 8403- 35- 7. Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- [9] Vasquez, D.L.L, Sabado, E.M., and Bangi, J.C. 2016. Insect pest of red cababage (*Brassica oleracea* L.) and life cycle of the cabbage worm, *Crocidolomia pavonana* F. In Lanalo del Sur Province Philipine. *Philipine Entomology* 30(2):149-158.
- [10] Isman, M.B., 2006. Botanical insecticides, deterrent and repellent in modern agriculture and an increasingly regulated word. *Annual Review of Entomology* 51:45-66.
- [11] Sharma, D. and Paul, Y. 2013. Preliminary and Pharmacological Profile of *Melia azedarach* L. An Overview. *Journal of Applied Pharmaceutical Science* 3(12):133-138.
- [12] Bullangpoti, Wajnberg V.E., Audant P., and Feyereisen, R. 2012. Antifeedant activity of *Jatropha gossypifolia* and *Melia azedarach* senescent leaf extracts on *Spodoptera frugiperda* (Lepidoptera: Noctuidae) and their potential use as synergists. *Pest Management Science* 68(9):1255-1264, https://doi.org/10.1002/ps.3291
- [13] Carpinella, M.C., Defago, M.T., Valladares, G., and Palacios, S.M. 2003. Antifeedant and Insecticide Properties of a Limonoid from *Melia azedarach* (Meliaceae) with Potential Use for Pest Management. *J. Agric. Food Chem.* 51 (2):369-374, DOI: 10.1021/jf025811w.
- [14] Nathan S.S., and Sehoon, K. 2006. Effects of *Melia azedarach* L. extract on the teak defoliator *Hyblaea puera* Cramer (Lepidoptera: Hyblaeidae). *Crop Protecton* 25(3):287-291, https://doi.org/10.1016/j.cropro.2005.03.023
- [15] Ahmed, M.F., Rao, A.S., Ahemad, S.R., and Ibrahim, M. 2012. Phytochemical Studies and Antioxidant Activity of *Melia azedarach* Linn Leaves by Dpph Scavenging Assay. *International Journal of Pharmaceutical Applications* 3(1) : 271-276
- [16] Asadujjaman, M., Saed, A., Hossain, M.A., and Karmakar, U.K. 2013. Assessment of bioactivities of ethanolic extract of *Melia azedarach* (Meliaceae) leaves. *Journal of Coastal Life Medicine* 1(2) : 118-122
- [17] Hammad, E.A. and Mcauslane, H.J. 2006. Effect of *Melia azedarach* L. Extract on *Bemisia argentifolii* (Hemiptera: Aleyrodidae) and Its Biocontrol Agent *Eretmocerus rui* (Hymenoptera: Aphelinidae). *Entomological Society of America* 35(3):740-745.
- [18] Bukovinszky, T., Potting R.P.J., Clough Y., van Lenteren, J.C. and Vet, L.E.M. 2005. The role of pre- and post-alighting detection mechanisms in the responses to patch size by specialist herbivores. *Oikos*, 109: 435-446.
- [19] Najmeh E., Talebi, A.A., Fathipour, Y. and Zamani, A.A. 2008. Host Plants Effect on Preference, Development and Reproduction of *Plutella xylostella* (L.) (Lepidoptera: Plutellidae) Under Laboratory Conditions. *Advances in Environmental Biology*, 2(3): 108-114.
- [20] Finch, S., and Collier R.H. 2000. Host-plant selection by insects—a theory based on ‘appropriate/inappropriate

- landings' by pest insects of cruciferous plant. *Entomologia Experimentalis et Applicata* 96: 91–102.
- [21] Huang, X., Renwick, J.A.A., and Gupta, K.S. 1993. Oviposition stimulants and deterrents regulating differential acceptance of *Iberis amara* by *Pieris rapae* and *P. napi oleracea*. *Journal of Chemical Ecology* 19: 1645–1662.
- [22] Sarikami G., Balkaya, A., and Yanmaz, R. 2009. Glucosinolates within a collection of white head cabbages (*Brassica oleracea* var. *capitata* sub.var. *alba*) from Turkey. *African Journal of Biotechnology* 8 (19): 5046-5052.
- [23] Halkier, B.A. and Gershenzon, J. 2006. Biology and Biochemistry of Glucosinolate. *Annual Review of Plant Biology* 57(1): 303-330.
- [24] Mulia, M.S., and Su, E.T. 1999. Activity and biological effects against arthropods of medical and veterinary importance. *Journal of the American Mosquito Control Association* 15(2):133-152,
- [25] Gajmer, T., Singh, R., Saini, R.K., and Kalidhar S.B. 2002. Effect of methanolic extracts of neem (*Azadirachta indica* A. Juss) and bakain (*Melia azedarach* L) seeds on oviposition and egg hatching of *Earias vittella* (Fab.) (Lep., Noctuidae), *Journal of applied entomology* 126(5): 238-243, <https://doi.org/10.1046/j.1439-0418.2002.00649.x>
- [26] Thara, S., Kingsley, S., and Revathi, N. 2008. Evaluation of neem derivatives as ovicides against *Earias vittella* (Lepidoptera: Noctuidae), *Journal of Applied Zoological Researches* 19(1):54-56