

ISBN : 978-602-1004-16-6



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL IV HITPI**

**STRATEGI PENGEMBANGAN
HIJAUAN PAKAN LOKAL**

Purwokerto, Desember 2015

Versi online : <http://fapet.unsoed.ac.id/>

Penyelenggara :
Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia (HITPI), Bekerja sama dengan,
Direktorat Pakan,
Direktorat Jenderal Perernakan Dan Kesehatan Hewan,
Kementerian Pertanian Republik Indonesia ,
Fakultas Perernakan Universitas Jenderal Soedirman

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL IV HITPI
(HIMPUNAN ILMUWAN TUMBUHAN PAKAN INDONESIA)**

**"Strategi Pengembangan Hijauan Pakan Lokal Berkualitas
Untuk Peningkatan Mutu Ternak"**

**Seminar dilaksanakan pada tanggal 18 - 20 Oktober 2015 di Fakultas
Peternakan Universitas Jenderal Soedirman**

**Versi elektronik prosiding ini dapat diakses melalui:
<http://fapet.unsoed.ac.id/>**

**Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga prosiding ini dapat disusun dengan baik. Prosiding ini memuat artikel-artikel yang telah dipresentasikan pada Seminar Nasional IV HITPI dengan tema “ Strategi Pengembangan Hijauan Pakan Lokal Berkualitas Untuk Peningkatan Mutu Ternak” yang diselenggarakan oleh HITPI (Himpunan Ilmuwan Tumbuhan Pakan Indonesia) bekerjasama dengan Fakultas Peternakan dan Direktorat Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2015.

Percepatan pemenuhan kebutuhan pangan asal ternak ruminansia sangat ditentukan oleh ketersediaan hijauan pakan berkualitas pada sentra produksi ternak. Secara global telah terbukti bahwa keberhasilan suatu negara dalam mensuplai hijauan pakan berkualitas secara murah berdampak pada kemampuan negara tersebut dalam menjamin keberlanjutan sistem stok ternak dan kontribusi produk pangannya secara nasional. Forum eminar yang berskala nasional telah memberikan wahana bagi para peneliti untuk saling berbagi dan berdiskusi mengenai hasil temuannya sekaligus membangun jejaring dan hasilnya disajikan dalam prosiding ini.

Prosiding ini tersusun berkat kerjasama antara berbagai pihak, utamanya penulis, dewan penyunting, sekretariat dan juga percetakan. Terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi. Semoga semua artikel yang dirangkai pada prosiding ini dapat digunakan sebagai rujukan ilmiah dalam menetapkan strategi dan langkah-langkah selanjutnya untuk mengembangkan sumberdaya peternakan di Indonesia, guna menajuketahanan pangan hewani dan kesejahteraan masyarakat.

Purwokerto, Desember 2015
Dekan Fakultas Peternakan
Universitas Jenderal Soedirman

Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, MSc.Agr.

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL IV HITPI
(HIMPUNAN ILMUWAN TUMBUHAN PAKAN INDONESIA)
“Strategi Pengembangan Hijauan Pakan Lokal Berkualitas Untuk
Peningkatan Mutu Ternak”**

©Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan pertama, 2015
Hak Cipta Dilindungi Undang undang
All Right Reserved

Perancang Sampul : Panitia Seminar Nasional IV HITPI
Penata Letak : Panitia Seminar Nasional IV HITPI
Pracetak dan Produksi : Tim Percetakan dan Penerbitan Unsoed

Penerbit

ISBN 978-602-1004-16-6

versi elektronik

DEWAN PENYUNTING

Caribu Hadi Prayitno, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman

Dwi Retno Lukiwati, Fakultas Peternakan dan Pertanian UNDIP

I Wayan Suarna, Fakultas Peternakan Universitas Udayana

Luki Abdullah, Fakultas Peternakan IPB

Ning Iriyanti, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman

Tri Rahardjo Sutardi, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman

Titin Widiyastuti, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman

SEKRETARIAT

Imbang Haryoko

Murniyatun

versi elektronik

DAFTAR ISI

Cover dalam	ii
Dewan Penyunting	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v

Makalah Utama	Penulis	Hal
Indigofera Sumber Konsentrat Hijau Prospektif Untuk Bisnis Pakan dan Peningkatan Produktivitas Ternak Forage Production and Management In The Tropics“	Luki Abdullah	1
Potensi Sistem Integrasi Sawit – Sapi Di Kalimantan Tengah(Study kasus di PT. Sulung Ranch)”	Z.A. Jelani and J. Sumarmono	14
Potensi Ekstrak Tanaman dalam Meningkatkan Produktifitas Ternak Ruminansia	Dwi Rahayu Lestantini	22
	Caribu Hadi Prayitno	29

Makalah Penunjang	Penulis	Hal
Pola Penyediaan dan Potensi Hijauan Di Kawasan Industri Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.	Setiana MA, Ikmahwati S, Yakin A, dan Prihantoro I	39
Pertumbuhan dan ProduktivitasKelor (<i>Moringa oleifera</i>) Periode Vegetatif Awal dengan Pemupukan Sumber P Yang Berbeda pada Tanah Ultisol	Simel Sowmen, Rusdimansyah, Siti Zainab, dan Mari Santi	44
Pertumbuhan dan Produksi Jerami Kedelai Akibat Inokulasi Bakteri Rhizobium dan Penambahan Hara Air Laut	Eny Fuskhah dan Adriani Darmawati	48
Produksi Jagung Manis dan Jerami pada Dua Periode Tanam dengan Pupuk Kandang Diperkaya Fosfat Alam dalam Sistem Integrasi Tanaman-Ternak	Dwi Retno Lukiwati, Endang Dwi Purbayanti, dan Retno Iswarin Pujaningsih	54
Perhitungan MCV dan MCHC Untuk Menganalisis Indikasi Anemia pada Kelinci yang Disuplementasi Daun Katuk dalam Pakan	Mohandas Indradji, Sri Hastuti, dan Diana Indrasanti	58
Pemurnian Benih Leguminosa Pakan Kalopo (<i>Calopogonium mucunoides</i>)	Achmad Fanindi, I.Herdiawan, E. Sutedi, Sajimin, dan B.R. Prawiradiputra	62
Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik, Kadar VFA dan Amonia Silase Pakan Komplit Secara In Vitro	Suparwi, Munasik dan Muhamad Samsi	67
Penampilan Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>) Defoliiasi Pertama pada Jarak Tanam dan Umur Defoliiasi yang Berbeda	Suwarno, Eko Hendarto, Nur Hidayat, Bahrun, Anisa Dewi Wardani Putri, dan Taufik Hidayat	71
Potensi Produksi Hijauan dan Komposisi Kimia Rumpun Sudan (<i>Sorghum sudanense</i>) Sebagai Sumber Hijauan Pakan Lokal Di Wilayah Papua	Onesimus Yoku	76
Daya Dukung Hijauan dan Limbah Tanaman Pangan Terhadap Pengembangan Populasi Ternak Sapi Potong di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa	Erwin Wantasen, S. Dalie dan F.N.S. Oroh	81

Makalah Penunjang	Penulis	Hal
Fenomena Tanaman Glirisidia (<i>Glyrisidia maculata</i>) di Pantai Petanahan Kabupaten Kebumen	Eko Hendarto, Suwarno, dan Pramono Soediarto	86
Edible Portion Karkas, Kadar Lemak dan Kolesterol Daging Domba dengan Imbangan Ampas Bir dan Rumput Gajah yang Berbeda	Agus Priyono dan Imbang Haryoko	90
Pertumbuhan Kacang Pinto (<i>Arachis pintoi</i>) yang Diberi Pupuk Kandang Sapi dan Mikoriza	Roni NGK, NN Candraasih K, NM Witariadi dan NW Siti	94
Optimalisasi Lahan Pekarangan Untuk Pemenuhan Pakan Usaha Ternak Domba Skala Rumah tangga	Sri Nastiti Jarmani	99
Efisiensi Penggunaan Pakan Hijauan pada Usaha Ternak Sapi Potong di Kabupaten Banjarnegara	Sri Mastuti, Yusmi Nur Wakhidati dan Oentoeng Edy Djatmiko	104
Produktivitas Kerja, Gaya Kepemimpinan Ketua dan Motivasi Berprestasi Anggota Kelompok Peternak Sapi Perah di Kabupaten Banyumas	Muhammad Nuskhi dan Lueje Setiana	109
Manajemen Padang Penggembalaan Di BPTUHPT Padang Mengatas	Yoselanda Marta	114
Pengaruh Pola Pemangkasian Teh Terhadap Jenis Keragaman Hijauan Pakan Di PTPN VIII Goalpara IV Kabupaten Sukabumi	Setiana M.A., Saidah I. Prihantoro I. dan Aryanto A.T.	122
Kualitas Fisik Karkas dan Kandungan Lemak Ayam Broiler yang Mendapat Ransum Tepung Kulit Buah Pepaya (<i>Carica papaya</i>) Sebagai Pengganti Kacang Hijau	Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi, R.R. Indrawati dan N. Tirta Ariana	128
Pengaruh Tepung Kulit Bawang Putih (<i>Allium sativum</i>) Dan Mineral Organik (Cr, Se Dan Zn Lysinat) pada Pakan Terhadap Konsumsi Pakan, Produksi dan Komponen Susu Kambing	Yusuf Subagyo, Tri Raharjo dan Caribu Hadi Prayitno	135
Pengaruh Daun Turi (<i>Sesbania grandiflora</i>) dan Lamtoro (<i>Leucaena leucocephala</i>) dalam Ransum Sapi Berbasis Indeks Sinkronisasi Protein - Energi Terhadap Sintesis Protein Mikroba Rumen	Afduha Nurus Syamsi, Fransisca Maria Suhartati, dan Wardhana Suryapratama	141
Pemberian Energi Ransum Yang Berbeda (<i>Flushing</i>) Terhadap Konsentrasi Estrogen dan Progesteron pada Kambing Jawarandu Setelah Kawin ¹	M. Socheh, D.M. Saleh, H.W. Kinanti C.H. Rachmawati, WS. dan H. Purwaningsih	151
Efektivitas Pupuk Organik Cair "USB" dan Suplementasi Herbal Terhadap Produktivitas Rumput Gadjah	Sufiriyanto, Sri Hastuti, dan Endro Yuwono	156
Evaluasi In Vitro Ransum Konsentrat Berbasis <i>Indigofera zollingeriana</i> dalam Sistem Rumen Kambing	Suharlina, L Abdullah, DA. Astuti, Nahrowi, dan A. Jayanegara	165
Pertumbuhan Tanaman <i>Arachis pintoy</i> yang Diberi Perlakuan Air Kelapa dan Panjang Stek	C.L. Kaunang dan M.I. Pontoh	169
Penggunaan Binder Tepung Limbah Ubi Jalar (<i>Ipomoea batatas</i>) terhadap Kualitas Fisik dan Kimia Pelet Legum <i>Indigofera sp.</i>	Iin Susilawati, Hery Supratman, Lizah Khairani, dan Muhamad Alfin	175

Makalah Penunjang	Penulis	Hal
Identifikasi Jenis-Jenis dan Kandungan Nutrisi Gulma Di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang Potensial Sebagai Bahan Pakan Ternak Ruminansia	P. Yuwono, T. Warsiti dan M.Kasmiatmojo	179
<i>Processing Properties</i> Pembuatan <i>Concentrated Yogurt</i> dari Susu Sapi Lemak Penuh dan Rendah, dengan dan Tanpa Penambahan Inulin	Juni Sumarmono, Mardiaty Sulistyowati, Triana Yuni Astuti, Nunung Noor Hidayat dan Kusuma Widayaka	182
<i>Saccharide Enrichment</i> Dalam Optimalisasi Fermentasi Bungkil Biji Jarak (<i>Jatropha curcas</i>) Menggunakan <i>Bifidobacterium bifidum</i>	Titin Widiyastuti, Bahrin, dan Hudri Aunurohman	185
Pengaruh Pemberian Pupuk Fosfat Terhadap Produksi Biji dan Hijauan Calopo (<i>Calopogonium mucunoides</i>) pada Lahan Masam	Sajimin, I.Herdiawan, E.Sutedi dan A.Fanindi	192
Efektifitas Perbanyakkan Kultur Tunggal Cendawan Mikoriza Arbuskula (<i>Gigaspora margarita</i> , <i>Glomus etinucatum</i> , <i>Acaulospora tuberculata</i>) pada Inang <i>Centrosema bubescens</i>	Prihantoro I., Rachim A.F., Aryanto A.T. dan Karti P.D.M.H.	198
Respons Pertumbuhan, Produksi, dan Kualitas Rumput Gajah Kate (<i>Pennisetum purpureum</i> cv. Mott) yang diberi Pupuk Urea, Bio-Urine, dan Kombinasinya	I Dewa Nyoman Sudita, I Nyoman Kaca, Luh Suariani, Ni Made Yudiastar, dan I Gede Sutapa	203
Potensi Pengembangan Pastura pada Lahan Pasca Tambang Timah Di Bangka Belitung	Karti, P.D.M.H, Prihantoro, I. dan Novita C.I.	211
Program Pengembangan Klaster Sapi Potong : Pola Pemeliharaan dan Penyediaan Lahan Tumbuhan Pakan	Akhmad Sodik, Pambudi Yuwono dan Novie Andri Setianto	216
Produktivitas <i>Indigofera zollingeriana</i> pada Berbagai Taraf Naungan (<i>Canopy</i>) dan Kemasaman Tanah di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	Iwan Herdiawan, Endang Sutedi dan Sajimin	220
Kandungan Protein Kasar dan Kecernaan Protein Silase Dalam Berbagai Perbandingan Campuran Jerami Jagung-Legum <i>Indigofera zollingeriana</i>	Rahmi Dianita, A. Rahman Sy, Ubaidillah, Ahmad Yani	234
Taraf Naungan Kelapa Sawit dan Penggunaan Pupuk Terhadap Produksi Hijauan dan Benih Kalopo (<i>Calopogonium mucunoides</i>) di Lahan Kering Masam	E. Sutedi, I. Herdiawan, dan Sajimin	238
Daya Dukung Hijauan Pakan dalam Konservasi Sapi Putih Taro	I W. Suarna, M.A.P. Duarsa, N.P. Mariani, L.G. Sumardani, dan S.A.Lindawati	246
Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik Sapi Bali yang Diberi Pakan Mengandung Daun Waru	Muhamad Bata dan Sri Rahayu	252
Pengaruh Umur Pemetongan Terhadap Kualitas Hijauan Sorgum Manis (<i>Shorghum bicolor</i> L. Moench) Varietas RGV	Munasik	258
Peran Tanaman Pakan Gamal (<i>Gliricidia sepium</i>) dalam Konservasi Lahan Pasca Tambang	I W. Suarna, N.N. Suryani, K.M. Budiassa, A.A.A.S. Trisnadewi, dan I.W. Wirawan	263

Makalah Penunjang	Penulis	Hal
Pertumbuhan Rumput <i>Brachiaria humidicola</i> dan <i>Stenotaphrum secundatum</i> pada Interaksi Pemupukan Unsur NPK	Nurhalan Bawole, W. Kaunang, S. D. Anis dan D.A. Kaligis	270
Hasil Bahan Kering dan Pertumbuhan Vegetatif <i>Gliricidia sepium</i> (Jacq) Steud pada Kepadatan Populasi dan Pemotongan Berbeda	Selvie D. Anis, David A. Kaligis dan Fredy Dompas	273
Penerapan Sistem Leisa (<i>Low Exsternal Input and Sustainable Agriculture</i>) Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Rumput Raja (<i>King grass</i>) pada Pemotongan Ketujuh	Suyitman, Lili Warly, Evitayani, A. Rachmat, dan Dear R.R.	280

versi elektronik

**PENGARUH DAUN TURI (*Sesbania grandiflora*) DAN LAMTORO (*Leucaena leucocephala*)
DALAM RANSUM SAPI BERBASIS INDEKS SINKRONISASI PROTEIN - ENERGI
TERHADAP SINTESIS PROTEIN MIKROBA RUMEN**

Afduha Nurussyamsi, Fransisca Maria Suhartati dan Wardhana Suryapratama

Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman

Email : nurussyamsiafduha@gmail.com

ABSTRACT

An experiment was aimed to assess the use of the legume leaf as a source of protein feedstuff and levels of synchronization protein-energy (SPE) index in the diet of cattles on ammonia (N-NH₃) and microbial protein synthesis (MPS). *In vitro* techniques was done. The research was used a completely randomized design (CRD), with factorially pattern (2x3), the first factor was the two species of legume (*Sesbania* leaves and *Leucaena* leaves) and the second factor was the three level of the SPE index (0.4, 0.5, and 0.6), there were 6 treatment combinations and each was 4 replicates. The results showed that no interaction between legume with SPE index, but each factor was significantly effect (P<0.05) on N-NH₃ of rumen fluid and MPS. The research concluded that *Leucaena* leaf is a legume that is better than *Sesbania* leaf in terms of their ability to increase MPS. SPE index is the best in producing MPS at level 0.6.

Key words: Legume, synchronization of protein and energy index, ammonia, microbial protein synthesis

PENDAHULUAN

Sapi potong maupun sapi perah sebagai ternak ruminansia membutuhkan asupan nutrisi pakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan produksinya. Pakan sapi umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Tanaman hijauan yang potensial dan mempunyai nilai hayati tinggi adalah tanaman leguminosa. Menurut Utomo (2012), leguminosa merupakan *proteinceus roughages* yaitu sumber pakan serat berprotein tinggi. Kandungan protein leguminosa rata-rata mencapai 22 % (Kushartono dan Iriani, 2004). Berlainan dengan sumber serat, sumber energi pakan sapi biasanya berasal dari limbah pertanian dan hasil sisa pengolahan pangan seperti dedak, onggok, dan pollard. Cakra dan Siti (2008) menyatakan bahwa pemberian sumber energi dalam pakan ternak penting untuk diperhatikan, karena dapat meningkatkan koefisien cerna nutrisi ransum. Oleh karena itu, pemberian leguminosa dan bahan pakan sumber energi merupakan suatu kombinasi bahan pakan yang baik bagi sapi.

Pemberian leguminosa sebagai sumber protein dan pemberian bahan pakan sumber energi bagi sapi harus mampu meningkatkan sintesis protein mikroba rumen (SPM), karena hewan ruminansia sangat bergantung pada keberadaan mikroba rumen dalam proses fermentasi pakan. Sintesis protein mikroba rumen (SPM) membutuhkan senyawa amonia yang tidak berlebihan dan energi sebagai rantai karbon dari degradasi karbohidrat dalam jumlah yang cukup. Menurut Widyobroto *et al.* (2007), suplai protein dan energi tersebut harus tersedia secara simultan (sinkron) agar proses SPM menjadi optimum. Ginting (2005) menyatakan bahwa efek *asynchronous* antara protein dan energi akan menimbulkan kerugian, apabila substansi protein terdegradasi lebih cepat dibandingkan sumber energi, maka sebagian besar protein dalam bentuk amonia akan terbuang melalui urin. Sebaliknya, apabila substansi sumber energi terfermentasi lebih cepat, maka akan terjadi akumulasi asam laktat dan dapat memicu terjadinya penurunan pH rumen yang dapat menyebabkan asidosis. Suplai amonia

dan energi yang sinkron dapat dicapai dengan penyesuaian degradasi protein dan fermentabilitas karbohidrat atau bahan organik (BO) dalam rumen.

Laju degradasi protein asal leguminosa rendah di dalam rumen karena berada dalam ikatan kompleks bersama tanin (Hadi *et al.*, 2011), sedangkan laju fermentabilitas BO pakan asal pengolahan pangan berada pada taraf sedang hingga tinggi. Perbedaan laju degradasi tersebut dapat diatasi dengan formulasi ransum berbasis indeks sinkronisasi protein-energi (SPE). Menurut Sinclair *et al.* (1993), penyusunan ransum berbasis indeks SPE berusaha menunjukkan keharmonisan degradasi protein dan fermentabilitas BO dalam rumen per jam yang dinyatakan secara kauntitatif dengan indeks optimum yaitu 1. Baik laju degradasi protein atau BO, juga indeks SPE bahan pakan lokal (termasuk leguminosa) belum terinventarisir dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian tentang pengaruh interaksi antara penggunaan leguminosa dan level indeks SPE terhadap produk fermentasi rumen terutama kadar amonia cairan rumen dan sintesis protein mikroba (SPM) rumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian diawali mengukur degradasi protein dan BO delapan jenis bahan pakan (rumput raja, daun turi, daun lamtoro, onggok, dedak, pollard, ampas tahu, dan bungkil kelapa) secara *in vitro* menurut metode Tilley dan Terry (1963) yang dimodifikasi dengan metode Orskov dan Mcdonald (1979) untuk menetapkan indeks sinkronisasi protein-energi (SPE). Laju degradasi protein dan bahan organik (BO) bahan pakan digunakan untuk menghitung indeks SPE menurut petunjuk Hermon *et al.* (2008).


$$\text{Indeks Sinkronisasi} = \frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{N}{BO \text{ per jam}}}}{24}$$

Keterangan : n : waktu pengamatan, N/BO per jam : laju degradasi protein dibanding laju degradasi bahan organik setiap jam (Hermon *et al.*, 2008).

Penelitian eksperimental dilakukan untuk mengukur kadar amonia dan SPM cairan rumen sapi perah secara *in vitro* (Tilley dan Terry, 1963). Materi yang digunakan adalah cairan rumen sapi Peranakan *Friesian Holstein* (PFH) jantan yang diambil dari rumah potong hewan (RPH) Mersi, Purwokerto, segera setelah sapi dipotong. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap (RAL) dengan pola faktorial (2x3), faktor A adalah leguminosa (turi dan lamtoro), faktor B adalah indeks SPE (0,4, 0,5, dan 0,6). Terdapat 6 kombinasi perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 4 kali. Pengukuran kadar N-NH₃ menggunakan tehnik mikrodifusi conwey (General Laboratory Procedures, 1966), sedangkan sintesis protein mikroba rumen (SPM) diukur dengan metode Zinn dan Owen (1986). Penelitian dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman pada medio Mei-Juli 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan laju degradasi protein rumput raja, daun turi, daun lamtoro, onggok, dedak, pollard, ampas tahu, dan bungkil kelapa masing-masing yaitu 2,2625, 5,4914, 4,7329, 1,2772, 3,2501, 7,0444, 6,5594, dan 7,5464 g N/jam, sedangkan laju degradasi bahan organik (BO) masing-masing bahan pakan yaitu 0,0103, 0,0164, 0,0135, 0,0080, 0,0091, 0,0236, 0,0203, dan 0,0524 kg BO/jam, dapat dilihat ilustrasinya pada Gambar 1.



Gambar 1. Laju degradasi protein bahan pakan sumber protein (Kiri) dan BO bahan pakan sumber energi (Kanan) pada interval waktu berbeda.

Grafik laju degradasi protein menunjukkan bahwa penurunan dan peningkatan degradasi protein masing-masing bahan pakan sumber protein memiliki kecenderungan yang sama, namun berbeda setelah jam ke 12. Menurut Hadi *et al.*(2011), degradasi protein leguminosa cenderung rendah karena adanya ikatan matrix bersama tanin. Menurut Suryahadi (1990), ampas tahu memiliki degradasi protein yang cukup tinggi di dalam rumen, degradasi protein akan tinggi sejak jam ke 0 hingga jam ke 4 dan konstan menurun pada jam berikutnya. Menurut Zamsari *et al.* (2012), protein bungkil kelapa memiliki kecenderungan degradasi yang tinggi di dalam rumen. Berbeda dengan degradasi protein, degradasi BO bahan pakan sumber energi memiliki kecenderungan trend yang sama pada setiap interval waktu, yaitu meningkat pada jam ke dua hingga ke empat dan drastis menurun setelah jam keempat dan stabil pada jam berikutnya, kecuali pada pollard. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Steven dan Hume (1998) yang menyatakan bahwa fermentasi bahan pakan sumber energi tertinggi pada 0-4 jam dalam cairan rumen dan menurun.

Data penelitian menunjukkan bahwa bahan pakan dengan indeks sinkronisasi rendah adalah dedak (0,29), daun lamtoro (0,31), daun turi (0,34) dan ampas tahu (0,37). Bahan pakan dengan indeks medium adalah pollard (0,42) dan rumput raja (0,58), sedangkan bahan pakan dengan indeks tinggi adalah onggok (0,71) dan bungkil kelapa (0,74). Berdasarkan indeks SPE tersebut disusunlah ransum berbasis indeks SPE seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan ransum perlakuan berbasis indeks sinkronisasi protein dan energi (SPE)

No	Bahan Pakan	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	 %					
1	Rumput Raja	35	50	54	35	50	54
2	Daun Turi	10	10	10	0	0	0
3	Daun Lamtoro	0	0	0	10	10	10
4	Onggok	3	6	15	3	6	15
5	Dedak	26	14	1	26	14	1
6	Pollard	8	5	3	8	5	3
7	Ampas Tahu	14	9	3	14	9	3
8	Bungkil Kelapa	3	5	13	3	5	13
9	Mineral	1	1	1	1	1	1
Total		100	100	100	100	100	100
Indeks Sinkronisasi		0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6
Nutrien							
Bahan Kering, %		92.61	93.30	92.75	92.58	93.27	92.71
Protein Kasar, % BK		12.29	12.24	12.53	12.25	12.19	12.49
Lemak Kasar, % BK		5.31	5.35	5.97	5.49	5.54	6.16
Serat Kasar, % BK		21.21	23.18	23.13	21.17	23.14	23.08
BETN, % BK		50.37	48.77	49.02	50.37	48.76	49.01
TDN, %		68.02	66.39	67.16	68.23	66.59	67.37

Keterangan : (R : Ransum Perlakuan), (Kadar nutrisi dihitung berdasarkan: Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Unsoed, 2015), (TDN : dihitung dengan rumus % TDN = 70,60 + 0,259 PK + 1,01 LK - 0,76 SK + 0,0991 BETN (Sutardi, 2001)).

Kadar Amonia (N-NH₃) Cairan Rumen

Rataan kadar N-NH₃ hasil pengamatan penelitian berada pada kisaran 12,15-13,53 mM cairan rumen (Tabel 2). Menurut McDonald *et al.* (1987), kisaran konsentrasi amonia yang cukup untuk pertumbuhan mikroba yang maksimal adalah 85-300 mg/L atau setara dengan 2,7 – 14,3 mM cairan rumen. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara spesies leguminosa dan indeks SPE terhadap kadar N-NH₃, tetapi perlakuan leguminosa dan indeks sinkronisasi masing-masing berpengaruh nyata terhadap kadar N-NH₃ (P<0,05).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata kadar N-NH₃ cairan rumen yang mendapat daun turi lebih tinggi (12,79 mM) dibandingkan dengan yang mendapat daun lamtoro (12,10 mM). Hal tersebut terjadi karena pencernaan protein daun turi lebih tinggi dibandingkan daun lamtoro (Hadi *et al.*, 2011). Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa daun lamtoro memiliki kadar tanin mencapai 6% (Pamungkas *et al.*, 2008), sedangkan daun turi memiliki kadar tanin sebesar 0,1% (Soebarinoto, 1986), sehingga pencernaan protein daun lamtoro menjadi rendah dan sumbangan NH₃ dalam cairan rumen juga rendah.


Tabel 2. Rataan kadar amonia cairan rumen dan sintesis protein mikroba rumen (SPM)

Peubah	Perlakuan					
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
NH ₃ (mM)	13,53±0,42	12,71±0,51	12,15±0,30	12,65±0,93	12,38±0,86	11,28±0,55
SPM (mg/20ml)	103,7 ± 3,06	110,2±5,87	120,1±12,16	106,5±6,94	116,8±9,18	142,6±15,70

Keterangan : R1 = Turi + Indeks 0,4, R2 = Turi + Indeks 0,5, R3 = Turi + Indeks 0,6, R4 = Lamtoro + indeks 0,4, R5 = Lamtoro + indeks 0,5, R6 = Lamtoro + indeks 0,6,

Uji *orthogonal polynomial* pada faktor B menunjukkan bahwa indeks SPE berpengaruh secara linier terhadap kadar N-NH₃ dengan persamaan $Y = 15,896 - 6,8937 X$ dengan koefisien determinasi (r^2) = 0,42 (Gambar 2). Gambar tersebut menunjukkan bahwa kadar N-NH₃ terus menurun sejalan dengan meningkatnya indeks SPE. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Chumpawade *et al.* (2005) dan Seo *et al.* (2010) yaitu bahwa indeks SPE tidak berpengaruh nyata terhadap kadar N-NH₃. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan metode penelitian, kedua peneliti tersebut menggunakan metode *in vivo*, sehingga terdapat faktor penyerapan N-NH₃ pada dinding rumen. Selain itu, bahan pakan, materi penelitian dan susunan ransum yang digunakan dalam penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian ini. Basis penelitian Chumpawade *et al.* (2005) adalah bahan pakan berkualitas rendah yaitu jerami padi, sedangkan Seo *et al.* (2010) menggunakan bahan pakan penyusun konsentrat yang sangat beragam.

Penurunan kadar N-NH₃ dari indeks SPE rendah (0,4) sampai indeks SPE tinggi (0,6) disebabkan oleh peningkatan sintesis protein mikroba rumen. Bata dan Hidayat (2010) menyatakan bahwa kadar N-NH₃ dalam cairan rumen tergantung pada jenis sumber protein yang digunakan, tingkat degradabilitas sumber protein dalam cairan rumen, dan SPM dalam cairan rumen. Semakin tinggi indeks SPE, maka SPM semakin optimum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ginting (2005) yang menyatakan bahwa tujuan dari pengaturan indeks SPE adalah untuk menyediakan secara simultan N-NH₃ dan energi untuk kepentingan SPM, sehingga tidak banyak N-NH₃ yang terbuang selama proses fermentasi.




Gambar 2. Pengaruh indeks SPE terhadap kadar N-NH₃ cairan rumen

Sintesis Protein Mikroba (SPM) Rumen

Rataan sintesis protein mikroba rumen (Tabel 2) berada pada kisaran 103,67-142,55 mg/20 ml cairan rumen. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Suhartati (2005) yaitu SPM 140-161,6 mg/20 ml cairan rumen, tetapi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Alwi *et al.* (2013) yaitu 3,98-5,54 mg/20 ml cairan rumen. Kesamaan yang terjadi dengan penelitian Suhartati (2005), karena sama-sama menggunakan leguminosa sebagai percobaan, sedangkan Alwi *et al.* (2013) menggunakan *bagasse* tebu fermentasi dengan kandungan protein yang rendah. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa perlakuan leguminosa berpengaruh nyata ($P < 0,05$) dan perlakuan indeks SPE berpengaruh sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap SPM. Berdasarkan uji beda nyata jujur (BNJ) diketahui bahwa rata-rata SPM cairan rumen yang mendapat daun lamtoro lebih tinggi (121,966 mg/20 ml) dibandingkan dengan yang mendapat daun turi (111,310 mg/20 ml). Hal tersebut diduga disebabkan karena pengaruh tanin yang menyebabkan lambatnya perubahan protein menjadi amonia pada lamtoro. Namun, melambatnya pelepasan amonia tersebut menyebabkan tingkat keharmonisan yang lebih baik dibandingkan dengan turi, sehingga proses sintesis protein mikroba lebih optimum pada penggunaan daun lamtoro.

Hasil uji *orthogonal polynomial* menunjukkan bahwa indeks SPE berpengaruh secara linier terhadap SPM dengan persamaan $Y = 51,091 + 131,09 X$ dengan koefisien determinasi (r^2) = 0,48. Gambar 3 menunjukkan bahwa SPM meningkat seiring dengan peningkatan indeks SPE. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ginting (2005) bahwa intisari dari pengaturan indeks sinkronisasi protein dan energi adalah untuk meningkatkan SPM. Sinkronisasi yang dimaksud adalah adanya keharmonisan dalam penyediaan dan atau pelepasan amonia dari protein serta energi dari karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan SPM. Sinclair *et al.* (1993) menyatakan bahwa indeks SPE 1 (satu), menunjukkan adanya keharmonisan antara ketersediaan energi dan protein di dalam cairan rumen. Semakin mendekati angka satu maka semakin meningkat SPM dalam cairan rumen. Menurut Elseed (2005), pemberian sumber protein dan energi secara simultan akan meningkatkan pertumbuhan N mikroorganisme, sedangkan menurut Rotger *et al.* (2006), angka sinkronisasi protein-energi yang tinggi memiliki kecenderungan meningkatkan N mikroorganisme di dalam cairan rumen.




Gambar 3. Pengaruh indeks SPE terhadap SPM cairan rumen

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengamatan konsentrasi amonia dengan SPM (Gambar 4) dengan persamaan $Y = 2864,2 - 19,21X$ ($r^2 = 0,99$). Peningkatan

SPM dapat diikuti dengan penurunan kadar amonia di dalam cairan rumen. Penurunan kadar amonia rumen bukan disebabkan karena produksinya yang menurun, tetapi karena amonia telah digunakan oleh mikroorganisme dalam sintesis proteinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Puastuti dan Mathius (2005) bahwa menurunnya konsentrasi NH_3 dalam cairan rumen diiringi dengan meningkatnya sintesis protein mikroba. Menurut Nolan (1993), amonia merupakan sumber utama nitrogen yang sangat penting bagi hewan inang. Maynard *et al.* (1979) menyatakan bahwa 80% mikroorganisme rumen menggunakan amonia sebagai satu-satunya sumber nitrogen.

Widyobroto *et al.* (2007) menyatakan bahwa sintesis protein mikroba sangat tergantung pada kadar N- NH_3 dan Alwi *et al.* (2013) menyatakan bahwa peningkatan sintesis protein mikroba akan diikuti dengan penurunan kadar N- NH_3 dalam cairan rumen. Yang *et al.* (2010) memiliki pendapat berbeda, bahwa peningkatan sintesis protein mikroba rumen tidak selalu diikuti dengan penurunan kadar N- NH_3 , sehingga kadar N- NH_3 tidak selalu dapat menunjukkan tinggi rendahnya SPM. Menurut Bata dan Hidayat (2010), konsentrasi N- NH_3 dalam cairan rumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis sumber protein yang digunakan, tingkat degradabilitasnya di dalam rumen dan SPM. Artinya bahwa penurunan dan peningkatan N- NH_3 tidak selalu disebabkan oleh SPM, pada suatu kejadian dapat berlaku hal yang berbeda yaitu SPM tinggi dan diikuti dengan kadar N- NH_3 yang tinggi atau kejadian sebaliknya juga dapat berlaku yaitu SPM rendah diikuti dengan kadar N- NH_3 yang rendah. Cole dan Tood (2008) berpendapat bahwa penggunaan N- NH_3 dalam SPM tergantung pada ketersediaan energi, sehingga hubungan tersebut akan optimal ketika ketersediaan energi juga tercukupi. Produksi N- NH_3 yang tinggi diikuti dengan ketersediaan energi yang tinggi serta keduanya tersedia secara simultan akan meningkatkan SPM. Oleh karena itu, penerapan sinkronisasi protein dan energi dalam penyusunan ransum ternak ruminansia sangat penting untuk diperhatikan, karena dapat meningkatkan SPM dan SPM merupakan sumber protein utama bagi ternak ruminansia.



Gambar 4. Hubungan antara kadar amonia cairan rumen dan sintesis protein mikroba rumen

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian yaitu bahwa daun lamtoro merupakan leguminosa yang lebih baik dibandingkan dengan daun turi ditinjau dari kemampuannya dalam meningkatkan SPM. Indeks SPE yang terbaik dalam menghasilkan SPM yaitu pada level 0,6.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M., W. Suryapratama dan F.M. Suhartati. 2013. Fermentasi Ampas Tebu (Bagasse) Menggunakan *Phanerochaete chrysosporium* Sebagai Upaya Meningkatkan Produk Fermentasi Rumen Secara *In Vitro*. *Jurnal ilmiah Peternakan*. 1(2): 479-487.
- Bata, M. dan N. Hidayat. 2010. Penambahan Molases untuk Meningkatkan Kualitas Amoniasi Jerami Padi dan Pengaruhnya terhadap Produk Fermentasi Rumen Secara *In-Vitro*. *Agripet*. 10(2): 27-33.
- Cakra, I.G.L.O. dan N.W. Siti. 2008. Coefisien Digestibility of Dry Matter and Nutrition Content of Etawah Cross Breed Goat Ration With Forage and Molamik Concentrate. *Majalah Ilmiah Peternakan*. 11(1): 11-17.
- Chumpawadee S., K. Sommart, T. Vongpralub, and V. Pattarajinda. 2005. Effect of Synchronizing The Rate of Degradation of Dietary Energy and Nitrogen Release on Reproductive Performance in Brahman-Thai Native Crossbred Beef Cattle. *Songklanakarn Journal Science Technol*. 28: 59-68.
- Cole, N.A. and R.W. Tood. 2008. Opportunities to Enhance Performance and Efficiency Through Nutrients Synchrony in Concentrate-Fed Ruminants. *Journal of Animal Science*. 86 : E 318-E 333.
- Elseed, F.A.M.A. 2005. Effect of Supplemental Protein Feeding Frequency on Ruminal Characteristics and Microbial N Production in Sheep Fed Treated Rice Straw. *Small Rumin. Res*. 57:11-17.
- General Laboratory Procedures. 1966. *General Laboratory Procedures Department of Dairy Science*. University of Wisconsin, Madison.
- Ginting, S.P. 2005. Sinkronisasi Degradasi Protein dan Energi dalam Rumen untuk Memaksimalkan Produksi Protein Mikroba. *Wartazoa*. 15(1): 1-10.
- Hadi, F.H., Kustantinah, dan H. Hartadi. 2011. Kecernaan *In Sacco* Hijauan Leguminosa dan Hijauan Non-Leguminosa dalam Rumen Sapi Peranakan Ongole. *Buletin Peternakan*. 35(2): 79-85.
- Hermon, M., Suryahadi, K.G. Wiryawan dan S. Hardjosoewignjo. 2008. Nisbah Sinkronisasi Suplai N-Protein dan Energi dalam Rumen Sebagai Basis Formulasi Ransum Ternak Ruminansia. *Media Peternakan*. 31(3): 186-194.
- Kushartono, B dan N. Iriani. 2004. Inventarisasi Keanekaragaman Pakan Hijauan Guna Mendukung Sumber Pakan Ruminansia. *Prosiding Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian*, Balai Penelitian Ternak. Ciawi, Bogor.
- Maynard, L. A., J.K Loosli, H.F Hintz and R.G Warner. 1979. *Animal Nutrition, 7th ed*. Tata McGraw Hill Publishing Company Limited. New Delhi.
- McDonald, P., R.A. Edward, and J.F.D. Greenhalgh. 1987. *Animal Nutrition, 8th edition*. Longman Group (FE) Ltd. Hongkong.

Seminar Nasional IV - HITPI. "Strategi Pengembangan Hijauan Pakan Lokal Berkualitas Untuk Peningkatan Mutu Ternak" Purwokerto 18 - 20 Oktober 2015 .ISBN.

- Nolan. 1993. *Nitrogen Kinetics. in : Quantitative Aspect of Ruminan Digestion and Metabolism.*J.M Forbes and J. France (Editors).C.A.B International. Wallingford.
- Orskov E.R., and I. McDonald. 1979. The Estimating of Protein Degradability in The Rumen From Incubation Measurement Weighted Activating to Rate of Passage. *Journal of Agrculture Science.Camb.* 92: 499-503.
- Pamungkas, D., Y.N. Anggraeni, Kusmartono dan N.H. Krishna. 2008. Produksi Asam Lemak Terbang dan Amonia Rumen Sapi Bali pada Imbangan Daun Lamtoro (*L. leucocephala*) dan Pakan Lengkap yang Berbeda. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner.* Universitas Brawijaya. Malang.
- Puastuti, W. dan I.W. Mathius.2005. Pengaruh Substitusi Bungkil Kedelai Terproteksi Getah Pisang Sebagai Sumber Protein Tahan Degradasi Terhadap Fermentasi Rumen. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner.* Balai Penelitian Ternak, Bogor.
- Rotger, A., A. Ferret, S. Calsamiglia, and X. Manteca. 2006. Effects of Nonstructural Carbohydrates and Protein Sources on Intake, Apparent Total Tract Digestibility, and Ruminant Metabolism *In Vivo* and *In Vitro* with High-Concentrate Beef Cattle Diets. *Journal Animal Science.* 84:1188-1196.
- Seo, J.K. J. Yang, H.J. Kim, S.D. Upadhaya, W.M. Cho, and J.K. Ha. 2010. Effect of Synchronization of Carbohydrate and Protein Supply on Ruminant Fermentation. Nitrogen Metabolism and Microbial Protein Synthesis in Holstein Steers. *Asian Australian Journal of Animal Science.* 23(11) : 1455 – 1461.
- Sinclair, L.A., P.C. Garnsworthy, J.R. Newbold, and P.J. Buttery. 1993. Effects of Synchronizing The Rate of Dietary Energy and N Release in Diets on Rumen Fermentation and Microbial Rumen Protein Synthesis in Sheep. *Journal of Agriculture Science.Camb.* 120: 251-263.
- Soebarinoto. 1986. Evaluasi Beberapa Hijauan Pohon Leguminosa Tropis Sebagai Sumber Protein untuk Ternak. *Disertasi.* Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Steven, C.E. and I.D. Hume. 1998. Contributions of Microbes in Vertebrate Gastrointestinal Tract to Production and Conservation of Nutrients. *American Psychological Society.* 78(2): 393-427.
- Suhartati, F.M. 2005. Proteksi Protein Daun Lamtoro (*Leucane leucocephala*) Menggunakan Tanin, Saponin, Minyak dan Pengaruhnya Terhadap Ruminant Undegradable Dietary Protein (RUDP) dan Sintesis Mikroba Rumen. *Animal Production.* 7(1): 52-58.
- Suryahadi. 1990. *Ruminant Nutrition.* Inter-University Centre of Biological Sciences. Bogor Agricultural University. Bogor.
- Sutardi, T. 2001. Revitalisasi Peternakan Sapi Perah Melalui Penggunaan Ransum Berbasis Limbah Perkebunan dan Suplementasi Mineral Organik. *Laporan Penelitian Akhir RUT VIII 1.* Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dan LIPI.
- Tilley, J.M. A. and R.A. Terry, 1963. The Relationship Between The Soluble Constituent Herbage and Their Dry Matter Digestibility. *Journal British Feed Science.* 18: 104-111.
- Utomo, R. 2012. *Evaluasi Pakan dengan Metode Noninvasif.* Citra Ajiprama. Yogyakarta.

Seminar Nasional IV - HITPI. "Strategi Pengembangan Hijauan Pakan Lokal Berkualitas Untuk Peningkatan Mutu Ternak" Purwokerto 18 - 20 Oktober 2015 .ISBN.

Widyobroto, B.P., S.P.S. Budhi dan A. Agus. 2007. Effect of Undegraded Protein and Energy Level on Rumen Fermentation Parameters and Microbial Protein Synthesis in Cattle. *Journal Indonesian Tropical Animal Agriculture*. 32(3): 194-200.

Yang, J.Y., J. Seo, H.J. Kim, S.Seo and J.K. Ha. 2010. Nutrients Synchrony: Is it a Suitable Strategy to Improve Nitrogen Utilization and Animal Performance. *Asian Australian Journal Animal Science*. 23(7): 972-979.

Zamsari, M., Sunarso, dan Sutrisno. 2012. Utilization of Natural Tannins in Protecting Coconut Meal Protein Judging from the Protein Fermentability *In Vitro*. *Animal Agriculture Journal*. 1(1): 405-416.

Zinn, R. and F. Owens. 1986. A Rapid Procedure for Purin Measurement and Its Use for Estimating Net Ruminant Protein Synthesis. *Canadian Journal of Animal Science*. 66: 157-166.

versi elektronik



SERTIFIKAT

diberikan kepada

F.M. SUHARTATI


Sebagai

PEMAKALAH

SEMINAR NASIONAL IV HITPI

**STRATEGI PENGEMBANGAN HIJAUAN PAKAN LOKAL BERKUALITAS
UNTUK PENINGKATAN MUTU TERNAK**

PURWOKERTO, 18 - 20 OKTOBER 2015



Ketua HITPI

Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc.Agr.

NIP. 0010-13-004



Ketua Panitia

Kejasama Dengan
FAKULTAS PETERNAKAN UNSOED
DAN
DIREKTORAT PAKAN DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN

Ir. Tri Rahardjo Sutardi, SU.

NIP. 19521114 198003 1 002


Mengetahui,



**Direktur Pakan Ternak Ditjen Peternakan
dan Kesehatan Hewan**

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc

NIP. 19660223 199003 1 001



**Dekan Fakultas Peternakan
UNSOED**

Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr.

NIP. 19690128 199403 1 004